2005 年 11 月

お客様 各位

日本バイオ･ラッド ラボラトリーズ株式会社
ライフサイエンス事業本部 マーケティング
Tel 03-5811-6271　Fax 03-5811-6272

TransFectin™ Lipid Reagent
使用方法の訂正とお詫び

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素はバイオ･ラッド製品をご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。今回、TransFectin™ Lipid Reagent（カタログ番号：170-3350, 170-3351, 170-3352）に添付されている取扱説明書に記載されております使用方法に誤りがございました。下記の訂正事項をご参照の上、訂正いただきますようお願い申し上げます。

このような記載に誤りがございましたことを深くお詫び申し上げます。ご不明な点などございましたら弊社ライフサイエンス事業本部マーケティング、もしくは担当営業までお問合せいただきますようお願い致します。

敬具

訂正事項

TransFectin™ Lipid Reagent 取扱説明書の正誤表

訂正個所	誤	正
プロトコール裏面「**接着細胞用プロトコール(24 ウェルプレートを用いる場合)**」の第 3 項	3. 1 ウェル当たり 50 µl の無血清培地を用意します。培地 50 µl に対して 0.25~0.4 µl の TransFectin を添加します。	3. 1 ウェル当たり 50 µl の無血清培地を用意します。培地 50 µl に対して 0.25~4 µl の TransFectin を添加します。
プロトコール裏面「**浮遊細胞用プロトコール(24 ウェルプレートを用いる場合)**」の第 3 項	3. 1 ウェル当たり 50 µl の無血清培地を用意します。培地 50 µl に対して 0.25~0.4 µl の TransFectin を添加します。	3. 1 ウェル当たり 50 µl の無血清培地を用意します。培地 50 µl に対して 0.25~4 µl の TransFectin を添加します。